

Agens	Smittkälla	Behandling	Inkubationstid	Bärarskap	Kontrollprov	Riskyрке	Förskolebarn	Handläggning
Amöba (Entamoeba histolytica)	Livsmedel Vatten Person - person	Beh. med antibiotika. Rådgör med infektionsspecialist.	Normalt 2 - 4 veckor (kan vara dagar - månader)	Obehandlad månader - år	1 kontrollprov, 1 vecka efter behandling.	Återgå vid symtomfrihet	Återgå vid symtomfrihet	Smittskyddsanmälan, smittspårning, samt muntlig och skriftlig patientinformation (smittskyddsblad)
Calicivirus <i>OBS! Mycket smittsamt</i>	Livsmedel Vatten Person - person	Symtomatisk	12 - 48 timmar	2 - 3 dygn	Behövs ej	Återgå efter 2 symtomfria dygn	Återgå efter 2 symtomfria dygn	Ej anmälningspliktig. Vid större utbrott av "Vinterkräksjuka" - ring smittskydd.
Campylobacter	Livsmedel Vatten Djur	Symtomatisk. Antibiotika kan övervägas vid allvarlig enterokolit eller septisk infektion. Rådgör med infektionsspecialist.	Normalt 2 - 5 dygn (kan vara 1 - 10 dygn)	Ca 3 veckor	Behövs ej	Återgå vid symtomfrihet	Återgå vid symtomfrihet	Smittskyddsanmälan, smittspårning, samt muntlig och skriftlig patientinformation (smittskyddsblad)
Cryptosporidier	Livsmedel Vatten Djur Person - person	Symtomatisk. Effektiv behandling saknas. För immunsupprimerade kan licenspreparat övervägas, rådgör med infektionsspecialist.	Normalt 2 - 7 dagar (kan vara 2 - 14 dagar)	1 - 3 veckor	Behövs ej	Återgå vid symtomfrihet	Återgå vid symtomfrihet	Smittskyddsanmälan, smittspårning, samt muntlig och skriftlig patientinformation (smittskyddsblad)
EHEC STX 1 , ej HUS	Livsmedel Vatten Djur Person - person	Antibiotika skall undvikas	Normalt 2 - 4 dygn (kan vara 1 - 8 dygn)	2 - 4 veckor (kan vara betydligt längre hos barn)	Behövs ej	Återgå vid symtomfrihet	Återgå vid symtomfrihet.	Smittskyddsanmälan, smittspårning, samt muntlig och skriftlig patientinformation (smittskyddsblad).
EHEC STX 2 samt STX 1 med HUS eller annan allvarlig sjukdom	Livsmedel Vatten Djur Person - person (ovanligt)	Antibiotika skall undvikas, men kan övervägas vid komplicerade septiska tillstånd. Rådgör med infektionsspecialist.	Normalt 2 - 4 dygn (kan vara 1 - 8 dygn)	2 - 4 veckor (kan vara betydligt längre hos barn)	Endast på förskolebarn och personer med riskyрке.	Återgå efter minst 1 neg F-odl.	Återgå efter minst 1 neg F-odl.	Smittskyddsanmälan, smittspårning, samt muntlig och skriftlig patientinformation (smittskyddsblad).
Giardia	Livsmedel Vatten Person - person	Beh. med antibiotika (personer med symtom såväl som symtomfria)	1 - 2 veckor	Obehandlad månader - år	Endast på förskolebarn. 1 kontrollprov bör tas 3 v efter behandling.	Återgå vid symtomfrihet	Återgå efter beh. och symtomfrihet (Obs! Kontrollprov bör tas 3 v efter avslutad beh.).	Smittskyddsanmälan, smittspårning, samt muntlig och skriftlig patientinformation (smittskyddsblad)
Rotavirus	Person - person	Symtomatisk	1 - 3 dygn	1 - 3 veckor	Behövs ej	Återgå efter 2 symtomfria dygn	Återgå efter 2 symtomfria dygn	Smittskyddsanmälan obligatorisk endast från mikrobiologiskt laboratorium.
Salmonella	Livsmedel Djur Person - person (ovanligt)	Symtomatisk. Antibiotika kan övervägas vid allvarlig enterokolit eller septisk infektion. Rådgör med infektionsspecialist.	12 - 48 timmar (kan vara 6 - 72 timmar)	4 - 6 veckor (kan vara månader - år)	Endast personer med riskyрке. <u>Om antibiotika givits</u> : 1 vecka efter avslutad beh. <u>Om antibiotika inte givits</u> : 1 - 2 veckor efter symtomfrihet	Återgå efter 1 neg F-odl.	Återgå vid symtomfrihet	Smittskyddsanmälan, smittspårning, samt muntlig och skriftlig patientinformation (smittskyddsblad).
Shigella	Livsmedel Vatten Person - person	Beh. med antibiotika. Rådgör med infektionsspecialist.	2 - 3 dygn (kan vara 1 - 7 dygn)	Upphör efter beh. med antibiotika. Vid obehandlad infektion vanligen 2 - 4 veckor	Endast på förskolebarn och personer med riskyрке. <u>Om antibiotika givits</u> : 1 vecka efter avslutad behandling. <u>Om antibiotika inte givits</u> : ca 2 veckor efter symtomfrihet	<u>Om antibiotika givits</u> : Återgå efter 1 neg F-odl. <u>Om antibiotika inte givits</u> : Återgå efter 3 neg F-odl. Obs! Högst 1 odling per dag.	<u>Om antibiotika givits</u> : Återgå efter 1 neg F-odl. <u>Om antibiotika inte givits</u> : Återgå efter 3 neg F-odl. Obs! Högst 1 odling per dag.	Smittskyddsanmälan, smittspårning, samt muntlig och skriftlig patientinformation (smittskyddsblad).
S.Typhi och S. Paratyphi	Livsmedel Vatten Person - person	Kan behandlas med antibiotika efter läkares bedömning	Vid septisk sjukdom 10 - 14 dygn, kortare om diarrésymtomen dominerar.	5 - 6 veckor. Vid obehandlad infektion blir ca 10 % bärare i upp till 3 månader. 2 - 5 % kroniskt bärarskap	Endast på förskolebarn och personer med riskyрке. Kontrollprov påbörjas tidigast 1 vecka efter avslutad beh. Högst 1 odling per dag.	Återgå efter 3 neg F-odl.	Återgå efter 3 neg F-odl.	Smittskyddsanmälan, smittspårning, samt muntlig och skriftlig patientinformation (smittskyddsblad).
Yersinia	Livsmedel Vatten Person - person (ovanligt)	Antibiotikabeh. endast vid mer svårartad sjukdomsbild. Rådgör med infektionsspecialist.	2 - 7 dygn (kan vara 1 - 10 dygn)	Upp till flera månader	Behövs ej	Återgå vid symptomfrihet.	Återgå vid symptomfrihet.	Smittskyddsanmälan, smittspårning, samt muntlig och skriftlig patientinformation (smittskyddsblad)