

## Lathund, åtgärder vid tarminfektioner

Agens	Smittkälla	Behandling	Bärarskap	Kontrollodling	Riskyрке	Barn/omsorg	Smittskyddsanmälan
<b>Amöba</b>	Livsmedel Vatten	Beh. med antibiotika	Månader-år	2 kontrollprov; 2 veckor efter avslutad beh.	Återgå vid symtomfrihet.	Återgå vid symtomfrihet.	Gäller endast Entamoeba histolytica, ej Entamoeba dispar. Alltid, samt skriftlig info till pat.
<b>Calicivirus</b> <i>OBS! mycket smittsamt.</i>	Person-person Livsmedel	Symtomatisk	2 dygn	Behövs ej.	Återgå efter 2 symtomfria dygn.	Återgå efter 2 symtomfria dygn.	Vid större utbrott av "Vinterkräksjuka" – kontakta Smittskydd.
<b>Campylobakter</b>	Livsmedel Vattendrag Djur	Ej antibiotika	Ca 3 veckor	Behövs ej	Återgå vid symtomfrihet.	Återgå vid symtomfrihet.	Alltid, samt skriftlig info till pat.
<b>Cryptosporidier</b>	Vatten Livsmedel Person-person	Nej	1-3 veckor	Behövs ej.	Återgå vid symtomfrihet.	Återgå vid symtomfrihet.	Alltid, samt skriftlig info till pat.
<b>EHEC STX1</b> Toxinbildande STX=Shigatoxin	Livsmedel Person-person Djur	Antibiotika skall undvikas	2-4 veckor	Endast personer med riskyrken.	Återgå efter 1 neg F-odl.	Återgå vid symtomfrihet.	Alltid, samt skriftlig info till pat. Vid inhemsk EHEC – kontakta Smittskydd.
<b>EHEC STX2</b> <i>och STX1 med HUS eller annan allvarlig sjukdom</i>	Livsmedel Person-person Djur	Antibiotika skall undvikas	2-4 veckor	Endast på barn och personer med riskyrken.	Återgå efter 1 neg F-odl.	Återgå efter 1 neg F-odl.	Alltid, samt skriftlig info till pat. Vid inhemsk EHEC – kontakta Smittskydd.
<b>Giardia</b>	Livsmedel Vatten Person-person	Beh. med antibiotika	Månader-år	Endast på barn. 1 kontrollprov; 3 veckor efter avslutad beh.	Återgå vid symtomfrihet.	Återgå vid symtomfrihet.	Alltid, samt skriftlig info till pat.
<b>Salmonella</b>	Livsmedel Djur	Återhållsamhet med antibiotika – förlänger bärarskapet	Vuxna - cirka 8 veckor. Barn - månader	Endast personer med riskyrke.	Omplacering. Återgå efter 1 neg F-odl.	Återgå vid symtomfrihet.	Alltid, samt skriftlig info till pat. Vid inhemsk salmonella – kontakta Smittskydd.
<b>Shigella</b>	Livsmedel Person-person	Beh. med antibiotika	Upphör efter beh.	1 vecka efter avslutad beh. Ingen beh: 3 neg prover högst 1 per dag.	Återgå efter 1 neg F-odl. Ingen beh: 3 neg prov högst 1 per dag.	Återgå efter 1 neg F-odl. Ingen beh: 3 neg prover högst 1 per dag.	Alltid, samt skriftlig info till pat. Vid inhemsk Shigella – kontakta Smittskydd.
<b>S.Typhi</b> <b>S.Paratyphi</b>	Livsmedel Person-person	Beh. med antibiotika	5-6 veckor. Kron. bärarskap - 2-5% av fallen.	3 neg F-odl. F-odl påbörjas 1 vecka efter beh.	Återgå efter 3 neg F-odl.	Återgå efter 3 neg F-odl.	Alltid, samt skriftlig info till pat. Alltid kontakt med smittskyddsläkare/infektionsläkare
<b>Yersinia</b>	Livsmedel	Sällan nödvändigt	2 veckor - 4 mån	Behövs ej.	Återgå vid symtomfrihet.	Återgå vid symtomfrihet.	Alltid, samt skriftlig info till pat.