

Screenodling för påvisande av MRB hos patient

Meticillinresistenta Stafylococcus aureus (MRSA), Vancomycinresistenta enterokocker (VRE), ESBL-producerande enterobacterales.

Screenodling ska ske om patienten:

- under det senaste halvåret varit inlagd på sjukhus eller annan vårdinrättning, alternativt fått sjukvårdande behandling* i öppenvård utanför Sverige
- under det senaste halvåret varit inlagd på sjukhus, vårdhem inom område i Sverige med särskild MRB-problematik.** Fråga på remissen efter den aktuella bakterien
- vårdats på enhet i Sverige med misstänkt spridning av MRB, eller behöver provtas av andra smittspårningsskäl. Fråga på remissen efter den aktuella bakterien

* Med sjukvårdande behandling menas ex såromläggning, dialys, suturering, insättande av venkateter, shunt eller urinkateter men inte enklare undersökningar t ex blodprovstagning och blodtrycksmätning.

** Se förteckning över aktuella områden på [smittskyddets webbsida](#).

Provtagningsanvisningar för MRB – screening

- Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen under Mikrobiologi, Resistenta bakterier (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2, Laboratoriemedicin Region Gävleborg)
- Vid smittspårning anges detta tydligt på remissen
- Misstänks infektion tas kliniskt prov från relevanta lokaler

Telefonnummer:

Smittskyddsläkare
Smittskyddssjuksköterska
Hygiensjuksköterska

026-15 53 09
026-15 53 08
026-15 51 65

Infektion
Mikrobiologen

026-15 40 00
026-15 55 55

| | |
|--|--|
| Remiss | Mikrobiologi, Gävle sjukhus |
| <u>Provtagningsmateriel</u> | Se provtagningsanvisning på Plexus |
| <u>MRSA</u> Näsa Svalg Perineum Sår/eksem Insticksställe som CVK, venflon, Peg, dränage Urin från KAD | Se platinadokument <u>09-71257 Provtagningsanvisning Multiresistenta bakterier MRB</u> |
| <u>VRE, ESBL</u> Faeces | Se platinadokument <u>09-71257 Provtagningsanvisning Multiresistenta bakterier MRB</u> |
| | Förvara kylt i väntan på transport |
| Analyserande Laboratorium | Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus |
| <p>Prov som inkommer till laboratoriet senast kl 16 på vardagar eller kl 15 på lördagar och söndagar samt övriga helgdagar, analyseras nästföljande vardag. Screeningnegativa MRSA- prover svaras ut vardagar. ESBL-producerande enterobacterales, svar vanligen inom 1-4 dagar. Negativa svar kan oftast lämnas snabbare än positiva som kräver fler tester. Prov från inläggande patienter besvaras enligt platinadokumentet 09-560552 - <i>Informationsdelning och hantering av vårdhygieniskt relevanta fynd.</i></p> | |

Provtagning vid tidigare påvisad MRB hos patient

Om patienten tidigare varit bärare av eller infekterad med MRB, ange på remissen vilken bakterie det gäller. Prov tas från utvalda lokaler.

Telefonnummer:

Smittskyddsläkare
Smittskyddssjuksköterska
Hygiensjuksköterska

026-15 53 09
026-15 53 08
026-15 51 65

Infektion 026-15 40 00
Mikrobiologen 026-15 55 55