

Vaccination mot pneumokocker

Region Gävleborg erbjuder vaccination mot pneumokocker till personer som har vissa sjukdomar och har fyllt 65 år eller är äldre. Det vaccin som används heter Pneumovax® och ges bara till de som aldrig tidigare blivit vaccinerade mot pneumokocker. Pneumovax® ger ett skydd under många år.

De pneumokockvacciner som funnits tillgängliga sedan 1970-talet har god effekt mot främst blodförgiftning och hjärnhinneinflammation hos vuxna och ges ofta till samma grupper som vaccineras mot influensa (personer äldre än 65 år och personer med vissa kroniska sjukdomar). En dos ger skydd som varar i upp till 10 år.

Information om pneumokocker

Pneumokocker är bakterier som är mycket vanliga i näsan på små barn utan att ge barnen några besvär. Eftersom bärarskap av pneumokocker i näsan är vanligast förekommande hos småbarn och dessa ofta är snuviga och infekterade också med andra bakterier och virus, sker den mesta smittspridningen av pneumokocker mellan och från barn i förskoleåldern.

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Ibland kan pneumokocker orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Pneumokockinfektioner är i regel lätta att behandla med antibiotika och det är ovanligt att i övrigt friska personer dör av infektionen.

Personer som erbjuds gratis en första vaccination mot pneumokocker:

Vuxna och barn över två år med följande diagnoser eller tillstånd:

	Hela gruppen	Läkar bedömning
• kronisk hjärtsjukdom		X
• kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma		X
• andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, t.ex. kroniska neurologiska sjukdomar eller cystisk fibros		X
• kronisk leversjukdom		X
• kronisk njursvikt		X
• diabetes mellitus		X
• aspleni/hypospleni	X	
• cystisk fibros	X	
• likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen	X	
• cochleaimplantat	X	
• tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation, hematologisk cancer, sicklecellsanemi	X	
• andra tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar pga. sjukdom eller behandling, t.ex. lungcancer, behandling med TNF-alfa-hämmare eller cytostatika		X
Samt:		
• Personer som är 65 år eller äldre	X	
• Personer med alkoholmissbruk		X
• Rökare		X