

Penicillinresistenta pneumokocker, PRP - Patientinformation

Varför har jag fått den här informationen?

Prover har visat att du har en bakterie, PRP, som är resistent (motståndskraftig) mot penicillin. I det här smittskyddsbladet kan du läsa mer om vad PRP innebär och vad du ska tänka på för att inte smitta andra.

Vad är pneumokocker och vad är PRP?

Pneumokocker är en av de vanligaste bakterierna i luftvägarna och finns ofta i näsan hos små barn utan att orsaka sjukdom. Detta kallas att vara bärare. Ibland kan pneumokocker orsaka infektioner, till exempel öroninflammation eller lunginflammation, vilka i enstaka fall kan utvecklas till svåra infektioner. PRP är pneumokocker som har blivit resistent mot penicillin. Vid infektioner som orsakas av PRP behöver man använda andra antibiotika än vanligt penicillin. PRP orsakar inte fler eller allvarigare infektioner än vanliga pneumokocker.

Hur smittar pneumokocker?

Pneumokocker smittar huvudsakligen genom hosta, nysningar och saliv. Små barn har ofta pneumokocker i näsan och risken för smittspridning är störst på förskolor där många små barn vistas nära varandra. Det är ovanligt att skolbarn och vuxna är bärare av pneumokocker. Om en vuxen eller ett skolbarn är bärare är risken att de smittar vidare mycket låg.

Kan jag bli av med PRP?

Om man är bärare av PRP och inte har symtom försvinner bakterierna av sig själv efter en tid. Vuxna är oftast bärare ett par veckor medan små barn kan vara bärare under 4–6 veckor, ibland under längre tid.

Vad ska jag tänka på för att inte smitta andra?

Du ska stanna hemma från skola, arbete och fritidsaktiviteter tills du blivit frisk. För barn i förskola gäller att barnet ska vara feberfritt och orka delta i förskolans normala aktiviteter. Det är viktigt att hålla en god handhygien.

Förhållningsregler

PRP är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du måste därför följa vissa regler som din läkare ger dig, så kallade förhållningsregler:

- Om din läkare säger att du ska gå på kontroller är du skyldig att hålla kontakt med din läkare och lämna de prov som är nödvändiga.

Om du har fått en förhållningsregel som du tycker är fel kan du ta kontakt med smittskyddsläkaren i din region.

Om smittskyddsbladet

Smittskyddsbladet gäller nationellt och tas fram av Smittskyddsläkarföreningen och Svensk Smittskyddssjuksköterskeförening.