

Syfilis - Patientinformation

Varför har jag fått den här informationen?

Du har blivit, eller misstänks ha blivit, smittad med syfilis. Här får du information om syfilis, hur den behandlas och vad du behöver göra.

Vad är syfilis?

Syfilis är en sjukdom som orsakas av en bakterie. Syfilisbakterien kan ge en infektion i slemhinnorna eller på huden vid könsorganet, ändtarmsöppningen eller munnen. Bakterien kan också finnas i blodet. Syfilis kan finnas i kroppen flera år utan att ge symtom.

Märker jag om jag fått syfilis?

Många som smittats har inga symtom. Några får sår på, i eller vid könsorganet, ändtarmsöppningen eller munnen. Såret läker oftast efter några veckor. En del får utslag på kroppen och ofta även i handflator och på fotsulor.

Är syfilis farligt?

Utan behandling kan syfilis ge allvarliga skador i olika organ.

Hur smittar syfilis?

Syfilis smittar framför allt genom oskyddat slidsamlag, analsamlag eller munsex. Om du är gravid finns det en risk att du kan smitta ditt barn under graviditeten. Alla gravida erbjuds provtagning för syfilis under tidig graviditet.

Även när en person inte har symtom är syfilis smittsamt. Obehandlad syfilis smittar vid sex under första året efter smittillfället. Smitta via blod och smitta till barnet under graviditet kan ske mer än ett år efter smittillfället.

Du blir inte immun mot syfilis och kan därför få syfilis flera gånger. Syfilis smittar **inte** via kläder, handdukar eller på toaletter.

Hur behandlas syfilis och hur länge är jag smittsam?

Syfilis behandlas med antibiotika (sprutor eller tabletter). Infektionen försvinner om du tar medicinen som du ska och följer de råd du fått. Behandlingen och besöken hos din läkare är gratis. Läkaren bedömer hur länge du är smittsam, vanligen är det tills en vecka gått efter sista antibiotikasprutan.

Har du fått ett återbesök måste du komma tillbaka till mottagningen. I de flesta fall tar man nya blodprover efter ett visst antal månader för att kontrollera att infektionen är borta.

Syns det vid provtagning att jag har haft syfilis?

Det kommer oftast att synas att du har haft syfilis om du tar blodprov för syfilis vid ett senare tillfälle. Laboratoriet gör då ytterligare analyser för att se om du har blivit smittad igen.

Vad ska jag tänka på för att inte smitta andra?

Syfilis är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du måste därför följa vissa regler, så kallade förhållningsregler.

Förhållningsregler

- Du måste berätta för den du har sex med att du har/kanske har syfilis.
- Du måste använda skydd (kondom) om du har sex innan din behandling/provtagning är färdig.
- Du måste komma på återbesök till mottagningen om du uppmanas till det.

Hur länge gäller förhållningsreglerna?

Din läkare kommer att tala om för dig när förhållningsreglerna sluta gälla. Det brukar vara en vecka efter sista antibiotikasprutan.

När du har syfilis får du inte riskera att smitta någon. Säkrast är att avstå från att ha samlag eller annan typ av sex innan läkaren säger att du inte har syfilis längre. Om du ändå har sex, måste du berätta för den personen att du har syfilis och ni måste använda skydd (kondom), se förhållningsregler ovan.

Tycker du att de förhållningsregler du fått är fel?

Du kan begära att smittskyddsläkaren i din region prövar beslutet om förhållningsregler. Du kontaktar då smittskyddsläkaren i din region.

[Kontaktuppgifter till smittskyddsläkare | Smittskyddsläkarföreningen \(slf.se\)](#)

Du kan också komma i kontakt med smittskyddsläkaren genom att ringa sjukvårdens växel i din region. Innan en sådan prövning är klar måste du följa de regler du har fått.

Smittspårning

Det är mycket viktigt att hitta personer som har syfilis så att de kan få behandling, dels för att minska risken för skador (se ovan), dels för att infektionen inte ska spridas till fler personer.

Enligt smittskyddslagen måste du medverka i smittspårning. Det innebär att du måste ge information till smittspåraren om vem du har haft sex med under det senaste året. Ibland behöver man gå ännu längre tillbaka. Du behöver också berätta om du lämnat blod eller delat injektionsverktyg.

Det du berättar är sekretessbelagt (hemligt) och de personer som du berättar om kommer inte att få reda på vem du är. De kommer bara att få veta att de måste testa sig. Uppgifter om dina kontakter kommer inte heller stå i din journal utan i en särskild smittspårningshandling.

Mer information

Mer information om syfilis finns på 1177 och UMO (ungdomsmottagningen på nätet).

[Syfilis | 1177 \(1177.se\)](https://1177.se)



[UMO | UMO \(umo.se\)](https://umo.se)

