

# Lathund för definition av vårdrelaterad infektion

**Åtgärdsrelaterad VRI = punkt 1. Vårdtidsrelaterad VRI = punkterna 2 och 3.**

**1.** Varje infektion som bedöms ha samband med:

- ett tidigare ingrepp eller
- en behandling,
- oberoende av i vilken vårdform ingreppet/behandlingen utförts eller ordinerats.

Tre typer kan särskiljas:

- a) Postoperativ infektion:** ytlig eller djup infektion i operationsområdet som debuterar
- <30 dagar efter kirurgi utan implantat eller
  - <1 år efter kirurgi med implantat.

**b) Övrig ingreppsrelaterad infektion:**

Infektion som kan relateras till tidigare eller pågående användning av åtgärder som bryter eller försvagar kroppens naturliga infektionsbarriärer.

- kateter, kärlinfart, dränage, intubation, punktion, injektion m fl åtgärder

**c) Läkemedelsrelaterad infektion:**

- infektion som uppkommer till följd av direkt läkemedeleffekt;
  - t ex *Clostridium difficile*-enterit i samband med antibiotikaanvändning
- En följd av läkemedels effekt på infektionsförsvaret.
  - T ex vid behandling med cytostatika (inkl methotrexate),
  - immunhämmare
    - t ex azatioprin, mykofenolatmofetil, ciklosporin, monoklonala antikroppar och TNF $\alpha$ -hämmare eller
  - Kortison behandling >1 mån
    - Vuxna prednisolon  $\geq 15$ mg/d –
    - Barn  $\geq 0,25$ mg/kg alt  $\geq 15$  mg/d.

**2.** Varje infektion som debuterar två dygn eller mer ( **$\geq 48$  timmar**) efter inskrivning inom slutenvården oberoende av tidigare vård eller behandling.

**3.** Varje infektion som debuterar **inom 48 timmar efter utskrivning** från slutenvård.

Obs! Bärarskap av olika typer av smittämnen (MRSA, VRE, ESBL) utan infektionstecken skall inte betraktas som vårdrelaterad infektion.

2019-03-14

Signar Mäkitalo  
Region Gävleborg