

## Läkemedel och viktnedgång

Användning av flera läkemedel ökar risken för vikt-  
nedgång och därmed ökad morbiditet och mortalitet.  
Biverkningar såsom minskad aptit, muntorrhet,

förändrad smakuppfattning, svampinfektion i munhåla/  
svalg/matstrupe, dyspepsi, illamående, förstoppning  
och diarré kan påverka nutritionsstatus och vikt.

Behandlingsområde	Exempel på läkemedel/läkemedelsgrupper
Diabetes mellitus typ 2	Metformin
Demenssjukdom	Kolinesterashämmare
Epilepsi	Antiepileptika
Hjärt-kärlsjukdom	Antiarytmika, digoxin, ACE-hämmare, betablockerare, acetylsalicylsyra, vissa medel mot kärlkramp
Immunologiska tillstånd	Immunsuppressiva och immunstimulerande läkemedel
Onkologiska sjukdomar	Antiandrogener, aromatashämmare, cytostatiska och cytotoxiska medel
Parkinsons sjukdom	Levodopa, dopaminagonister, COMT-hämmare
Psykiatriska sjukdomar	SSRI, tricykliskt antidepressiva, venlafaxin, hydroxizin, zopiklon, vissa neuroleptika
Smärta	Opioider, NSAID, buprenorfin
Trängningsinkontinens	Antikolinerga spasmolytika
Övriga	Protonpumpshämmare, laxermedel, järn, glukokortikoider för inhalation, pyridostigmin