

DROGSCREENING MED MULTITEST 12 PÅ HC

20181114

Marianne Andersson, distriktssköterska, Oxtorget's hälsocentral

Doktorama AB

BAKGRUND

- Blandmissbruk allt vanligare i befolkningen och särskilt i den grupp som vi inriktar oss på nu (dvs de som hänvisas till psykosociala teamen för samtalsbehandling)
- Förekomsten av droger och läkemedel i samhället har ökat markant de senaste åren i samband med den snabba nätförsäljningen
- Idag sitter man och beställer droger i soffan hemma i vardagsrummet, ingen behöver längre smyga i någon gränd eller uppsöka något obskyrt torg
- Viss evidens för att samtalsbehandling har sämre effekt om patienten har ett pågående missbruk och mycket större risk för att man inte fullföljer behandlingen
- Psykiatrien har som bekant i flera år använt drogtestning i samband med att patienter ska genomgå samtalsbehandling eller delta i läkemedelsassisterad behandling
- Vi har på våra hälsocentraler historiskt haft en hög förskrivning av beroendeframkallande läkemedel (OBS gäller ej Håstaholmens HC)
- Vi är trots allt ganska bra på att fråga om alkohol och att följa upp alkohol men när det gäller blandmissbruk så har vi inte pratat om det så ofta med våra patienter (förutom de mest uppenbara såklart särskilt yngre individer med känt haschmissbruk eller de individer som har neuropsykiatrisk problematik och självmedicinerar).

Konsekvensbeskrivning och riskanalys

- Vi har på våra hälsocentraler pratat ganska mkt om för och nackdelar med denna rutin och vilka risker den ev kan medföra för våra patienter och oss själva, ett axplock av vad som diskuteras följer nedan:

ökade kostnader för hc, svårt att ta hand m patienter vid upptäckt av missbruk, läkaren obekväm vid ordination i det enskilda mötet, patienter listar om sig, drogtestningen i sig osäker/ej exakt, risk för stigmatisering av enskilda patienter, merarbete för hc, patienter fuskar vid drogtestning, vi borde testa alkohol också.....osv.....

Trots det valde vi att gå vidare.


Hur går det till i praktiken?

- Läkare informerar och ordinerar drogtest i samband med läkarbesöket då man hänvisar till psykosocialt team och samtalsbehandling (KBT/Manualbaserad/IPT)
- Urinprovet utförs på hälsocentralen (oövervakat), patienten behöver ej vänta på svar, blanketten m svar scannas in i PMO t aktuell läkare
- Vid negativt svar eller positivt på de läkemedelssubstanser som man eventuellt står på - görs ingenting
- Vid positivt svar på "fel" substans avgör läkaren hur vi ska gå vidare beroende på de aktuella omständigheterna (känt missbruk sedan tidigare osv)
- Vi kräver/förutsätter 4 veckors drogfrihet innan samtalsbehandling påbörjas, även den nya drogtestningen sker idag oövervakat

Multitest 12 (urintest)

Detekterar följande droger:

- Amfetamin (AMP)
- Bensodiazepiner (BZO)
- Buprenorfin (BUP)
- Cannabis (THC)
- Clonazepam (ACL) *
- Fentanyl (FTY)
- Kokain (COC)
- Metadonmetabolit (EDDP)
- Metamfetamin (MET)
- Morfin (MOP)
- Oxycodone (OXY)
- Tramadol (TRA)



Provtagningsblanketten

	POSITIV	NEGATIV	OGILTIG
MORFIN (MOP)			
OXYCODONE (OXY)			
Metadonmetabolit (EDDP)			
KOKAIN (COC)			
TRAMADOL (TML)			
Benzodiazepiner (BZO)			
Amfetamin (AMP)			
Metamfetamin (MET)			
Fentanyl (FYL)			
Cannabis (THC)			
Buprenofin (BUP)			
Clonazepam (7-ACL)			

THC – den största drogen



Legaliseringen av droger..



Slut på laglig Cannabis i Canada efter 3 veckor med nya lagstiftningen (ur SvD 20181113)



Andra lättillgängliga produkter..



Finliret m drogtestning

- Detektionstider
 - Gränsvärden
 - Korsreaktioner
 - Fusk
-
- Ingen exakt vetenskap, vårt mål är att uppmärksamma, medvetandegöra, tydliggöra och förhoppningsvis bidra till att en förändring kan komma till stånd.
 - Vi övervakar ej drogtesterna nu, på sikt får vi se ffa med återkommande..
 - Vi är ingen polisiär eller dömande verksamhet..

Utfall och reaktioner

- Blandade reaktioner i läkargruppen initialt vid användning av nya rutinen, psykosociala teamen mkt positiva till den nya rutinen
- Än så länge inte några direkta reaktioner hos våra patienter (vi har precis börjat och ting tar tid som bekant)
- Vi har börjat använda multitestet i andra sammanhang också, ffa vid uppföljning av förskrivning av beroendeframkallande läkemedel

- Vi återkommer gärna om ett år!

Detektionstider i urin

- Skiljer sig åt mellan olika droger men vanligtvis är detektionstiden 2-4 dygn
- För metadon är detektionstiden 2 veckor
- För lågdos benzo upp till 4 dygn och för högdos benzo upp till 3 veckor
- För THC upp till 4 dygn vid sporadiskt bruk, vid långvarigt bruk flera månader

Gränsvärden

- För varje droganalys finns ett gränsvärde (cut-off)
- Det kan alltså vara så att ett drogtest är negativt även om det finns en liten mängd av drogen i provet

Korsreaktioner

- Vissa typer av läkemedel kan ge positiva svar på vissa droganalyser eftersom de kemiskt likar varandra
- Det finns en särskild lista med läkemedel som kan ge korsreaktioner på de droganalyser som används i Multitest 12

Fusk

Projekt

Resdagboken

Se.nu

Utbildning -
Spaguiden.com

TV.nu

Om Aftonbladet

Annorera

Hjälp & info

I din mail

I siffror

Klassresan

Kontakta oss

Ledda med dagens
bildning

Lediga jobb

Läsrpörelser

Om cookies

RSS



TV: Här smiter han från drogtestet

Thomas Bodström (S) går först med på att drogtestas i P3 Men när

Är man lite påhittig så kan man hitta detta på speciella tyska hemsidor bl a

